



INFORMACIÓN SOBRE LA...

Vacuna contra el VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Julio 2018

El virus del papiloma humano (VPH) o papilomavirus no es solo causante de problemas en las mujeres (cáncer de cuello del útero, fundamentalmente), sino también en los varones: verrugas genitales, cáncer de ano y pene, y también y con incidencia creciente, cáncer de garganta y zonas vecinas.

Como en las mujeres, la infección de los varones es frecuente y se contagia por el contacto sexual. En la mayoría de los casos esta infección no da ningún problema y desaparece sola, pero no hay pruebas de cribado en hombres de su persistencia.

Solo cuando persisten los virus durante muchos años en el organismo, y si son de determinadas familias concretas (tipos), es cuando pueden producir un tumor maligno. En nuestro país, estos tipos de cánceres son relativamente poco frecuentes. Un colectivo de especial riesgo son los varones homo o bisexuales.

La vacunación de todos, mujeres y varones, favorece la inmunidad de grupo.

En España hay comercializadas tres vacunas que previenen la infección por los tipos de papilomavirus que más habitualmente provocan estos tumores: Cervarix, Gardasil y Gardasil 9. Esta, que ha sido la última en comercializarse, cubre más del 90 % de los posibles virus oncogénicos y las dos anteriores el 75-80 %.

Todas las vacunas frente al VPH están autorizadas en varones, pero no están financiadas en nuestro país, salvo en alguna comunidad autónoma y para ciertos grupos de mayor riesgo. La edad mínima para la vacunación son los 9 años y las tres vacunas admiten pautas de 2 dosis, separadas entre sí 6 meses, hasta la adolescencia (Gardasil hasta antes de los 14 años y Cervarix y Gardasil 9 hasta antes de los 15). A partir de esas edades, la recomendación es de 3 dosis, con esquema 0, 1-2 y 6 meses.

Buscando una mayor eficacia, se recomienda completar la vacunación antes del comienzo de las relaciones sexuales. Gardasil y Gardasil 9 previenen también la aparición de otras lesiones benignas y más frecuentes, pero muy molestas, llamadas verrugas genitales o condilomas.

Se administran mediante inyección en el brazo. Los estudios muestran que son seguras y que apenas producen efectos secundarios.

Se recomienda, en cualquier caso, mantener las medidas adecuadas para evitar el contagio de otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.

Cervarix cuesta 121,81 euros por dosis, Gardasil 155,91 y Gardasil 9, 172,55 euros.